

го скопления остатков дезосредств доступные для животных (включая кормушки, поилки и другие участки поверхностей) промывают водой. С остальных поверхностей смывание остатков дезосредств не требуется. Животных вводят в помещения после проветривания.

Допускается проведение локальной дезинфекции отдельных свободных от животных стойл, клеток, единиц оборудования и участков поверхностей при обеспечении интенсивной вентиляции и отсутствия людей и животных в непосредственной близости к обрабатываемым объектам. Обработку следует проводить 0,25 % раствором Вироцида методом генерирования пены или методом протирания поверхности.

Дезбарьеры или дезоковрики заправляют 0,5% раствором Вироцида. Замену дезинфицирующего раствора производят по мере необходимости, но не реже чем 1 раз в 7 дней.

9. Контроль качества дезинфекции проводят в соответствии с методикой, изложенной в действующих "Правилах проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора" (2002 г.). В качестве нейтрализатора используют стерильную воду.

10. Вироцид не совместим с аннионными ПАВ и их растворами. Для применения рабочих растворов Вироцида при отрицательных температурах рекомендуется готовить рабочий раствор Вироцида на основе 30% водного раствора этиленгликоля.

#### IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

11. К работе с дезосредством Вироцид не допускаются лица моложе 18 лет и имеющие противопоказания для работы с дезосредствами.

При приготовлении рабочих растворов Вироцида следует избегать попадания Вироцида внутрь организма, на кожу, в глаза и органы дыхания.

Все работы с Вироцидом и его растворами необходимо проводить в спецодежде (включая резиновые перчатки, защитную маску и др.) Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. После окончания работы следует вымыть с мылом руки и лицо, рот прополоскать.

Запрещается использовать гару из-под препарата для личных целей.

12. При попадании Вироцида на кожу необходимо промыть его большим количеством воды с мылом. При попадании внутрь – выпить несколько стаканов воды с 10-15 таблетками активированного угля. Рвоту не вызывать. При появлении признаков отравления следует обратиться за медицинской помощью.

При попадании Вироцида в глаза следует немедленно промыть их водой и как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

В случае появления признаков отравления (головокружение, тошнота, слабость) следует немедленно обратиться к врачу и показать этикетку препарата.

Вироцид следует хранить в местах, не доступных для детей.

Инструкция разработана компанией "СИД ЛАЙНС НВ/СА"(Бельгия)  
совместно с компанией ООО "Интервет"(Москва)

(Организация-производитель: компания –«CID LINES NV/SA», Waterpoortstraat 2 Ieper 8900,Belgium)

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГУ «РосНИКИ».

Регистрационный номер

ПВН-5-36/СНТЕ

Представитель компании «СИД ЛАЙНС НВ/СА»  
по регистрации и сертификации в РФ

Новик

*[Подпись]*



Г. Шмелёва

17.05.06